

11.01.2016

# DEPISTAGE DES VIOLENCES SEXUELLES

dyades et triades diagnostiques



Dr Pierre LEVY



# PLAN

---

- 1) Triade de l'inceste
- 2) Existe-t-il une dyade ou une triade permettant de repérer les victimes d'inceste, parmi les victimes de violences sexuelles?
- 3) Existe-t-il des pathologies associées à une gravité, parmi ces victimes ?



---

# 1 .Triade de l'inceste :

**Etude AIVI/Ipsos sur la santé des victimes d'inceste**  
en partenariat avec Axa Atout Coeur

## **Dr Pierre Lévy**

Département de Santé Publique, Hôpital Tenon (AP-HP), Paris, France

## **Dr Catherine Bonnet**

## **Madame Isabelle Aubry**

AIVI

## **Pr Louis Jehel**

Département de Psychiatrie et Psychologie Médicale,  
Psychotraumatologie & Addictologie, Unité Sanitaire, CHU de Martinique,  
BP 632 - 97261 Fort de France Cedex, France



# METHODOLOGIE

---

Choix de 12 questions à partir de

L'ACE study a été conduite sur 13 494 adultes dans un centre médical, 70% de réponses et 200 questions (1995)

Le questionnaire sur le dépistage des traumatismes de Brewin (2002)

L'expérience des cliniciens

Comparaison entre

**341 victimes d'inceste** ont rempli un auto questionnaire

**946 individus représentatifs de la population générale** ont été interrogés par téléphone



# QUATRE DIMENSIONS EXPLOREES

---

**Addiction**

**Dépression - suicide**

**Syndrome post-traumatique**

**Retentissement somatique**



# DOUZE QUESTIONS

Q1	<b>Souffrir de troubles compulsifs alimentaires</b>
Q2	<b>Fumer en moyenne plus de 10 cigarettes par jour</b>
Q3	<b>Boire en moyenne plus de 3 verres d'alcool par jour (week-end inclus)</b>
Q4	<b>Consommer au moins une fois par semaine certaines drogues (cannabis, cocaïne, héroïne...)</b>
Q5	<b>Ressentir régulièrement le sentiment d'être très déprimé, de ne pas avoir le moral</b>
Q6	<b>Avoir régulièrement des idées ou des pulsions suicidaires</b>
Q7	<b>Se sentir régulièrement irritable ou avoir des explosions de colères</b>
Q8	<b>Sursauter ou trembler de façon excessive lorsqu'il arrive quelque chose d'inattendu</b>
Q9	<b>Avoir régulièrement peur des autres ou peur de leur dire non</b>
Q10	<b>Souffrir de douleurs chroniques et de façon très régulière (mal de dos, migraines)</b>
Q11	<b>Souffrir de pathologies graves (cancer, problèmes cardiaques, diabète...)</b>
Q12	<b>Eprouver une réelle peur d'avoir des enfants par crainte d'être un mauvais parent</b>

**Le test de Cronbach est égal à 0.79**



# DES SYMPTOMES INEXPLIQUES ET PERSISTANTS

---

Le **dévoilement** peut être **spontané**.

L'étude AIVI/Ipsos a révélé que **le délai moyen** est alors **de 16 ans**.

**Le temps ne guérit pas** certains effets à long terme de l'inceste sur la santé et la vie quotidienne.

Le **dévoilement** peut aussi survenir **après des questions** : les médecins sont en première ligne pour en poser après avoir constaté des symptômes en relation avec l'inceste.



# **A LA RECHERCHE D'UN OUTIL DE DEPISTAGE POUR REDUIRE LE DELAI DE SOUFFRANCE DES VICTIMES**

---

A partir du sondage AIVI/IPROS de février/mars 2010 nous avons recherché quelles questions parmi les douze permettraient de dépister l'inceste.





# ANALYSE UNIVARIEE

variable	Inceste	pas d'inceste	p
Sexe (femmes)	91%	52%	<0.0001
Age	38.5	46.5	<0.0001
<b>Q1 Souffrir de troubles compulsifs alimentaires</b>	75%	8%	<0.0001
<b>Q2 Fumer en moyenne plus de 10 cigarettes par jour</b>	55%	42%	<0.0001
<b>Q3 Boire en moyenne plus de 3 verres d'alcool par jour (week-end inclus)</b>	30%	16%	<0.0001
<b>Q4 Consommer au moins une fois par semaine certaines drogues (cannabis, cocaïne, héroïne...)</b>	65%	8%	<0.0001
<b>Q5 Ressentir régulièrement le sentiment d'être très déprimé, de ne pas avoir le moral</b>	99%	55%	<0.0001
<b>Q6 Avoir régulièrement des idées ou des pulsions suicidaires</b>	86%	13%	<0.0001
<b>Q7 Se sentir régulièrement irritable ou avoir des explosions de colères</b>	92%	51%	<0.0001
<b>Q8 Sursauter ou trembler de façon excessive lorsqu'il arrive quelque chose d'inattendu</b>	83%	31%	<0.0001
<b>Q9 Avoir régulièrement peur des autres ou peur de leur dire non</b>	94%	28%	<0.0001
<b>Q10 Souffrir de douleurs chroniques et de façon très régulière (mal de dos, migraines)</b>	85%	53%	<0.0001
<b>Q11 Souffrir de pathologies graves (cancer, problèmes cardiaques, diabète...)</b>	20%	18%	0.33
<b>Q 12 Eprouver une réelle peur d'avoir des enfants par crainte d'être un mauvais parent</b>	64%	11%	<0.0001



# SEPT QUESTIONS POUR DEPISTER L'INCESTE

Pouvoir explicatif (R<sup>2</sup>)= 65%

Questions	OR	p
cte	0.002	<0.0001
<b>Q1 Souffrir de troubles compulsifs alimentaires</b>	<b>6.0</b>	<b>&lt;0.0001</b>
Q3 Boire en moyenne plus de 3 verres d'alcool par jour (week-end inclus)	2.4	0.0025
Q5 Ressentir régulièrement le sentiment d'être très déprimé, de ne pas avoir le moral	3.6	0.0114
<b>Q6 Avoir régulièrement des idées ou des pulsions suicidaires</b>	<b>4.4</b>	<b>&lt;0.0001</b>
Q8 Sursauter ou trembler de façon excessive lorsqu'il arrive quelque chose d'inattendu	2.0	0.0066
<b>Q9 Avoir régulièrement peur des autres ou peur de leur dire non</b>	<b>6.8</b>	<b>&lt;0.0001</b>
Q12 Eprouver une réelle peur d'avoir des enfants par crainte d'être un mauvais parent	3.5	<0.0001
Sexe	4.3	<0.0001
Age	0.98	0.0159



# TRIADE CHEZ LA FEMME

**Idées suicidaires  
Compulsions alimentaires  
Peur des autres**

	Valeur Prédictive Positive VPP	Valeur Prédictive Négative VPN	Sensibilité	Spécificité
Femmes	<b>91</b>	<b>82</b>	67	96
Hommes	76	97	45	99

**91% de femmes qui ont la triade ont vécu l'inceste**

82% des femmes chez qui il manque un des 3 signes n'ont pas vécu l'inceste



# TETRADE CHEZ L'HOMME

---

**Idées suicidaires**  
**Compulsions alimentaires**  
**Peur des autres**  
**Absence de désir d'enfant**



# COMMENT UTILISER CETTE TRIADE/TETRADE ?

---

Dès qu'un symptôme de la triade/tétrade est présent, rechercher la présence des deux/trois autres.

Poser des questions ouvertes sur les antécédents en général, puis des questions de plus en plus spécifiques pour permettre de faire un lien entre la triade et des antécédents d'inceste.

Adresser le/la patient(e) à des unités de consultations spécialisées et formées en psycho-traumatologie.



---

## 2 . Etude SVS14-01

### **Dr Pierre Lévy**

Département de Santé Publique, Hôpital Tenon (AP-HP),  
Paris, France

### **Dr Jean-Louis Thomas, Dr Violaine Guérin**

Département médical Stop aux Violences Sexuelles  
(SVS), 28 rue Laure Diebold, 75008 Paris, France

### **Pr Louis Jehel**

Département de Psychiatrie et Psychologie Médicale,  
Psychotraumatologie & Addictologie, Unité Sanitaire,  
CHU de Martinique, BP 632 - 97261 Fort de France  
Cedex, France



# METHODOLOGIE

---

## Critères d'inclusion

- Personnes victimes de violences sexuelles dans les antécédents

## Méthodologie

- Pas de groupe témoin

188 sujets



---

## Question

Existe-t-il une dyade ou une triade permettant de repérer les victimes d'inceste, parmi les victimes de violence sexuelles?





---

## Réponse

Non : tous les modèles multivariés testés sont peu explicatifs (10%).

Donc :

- . soit il n'en existe pas,
- . soit le questionnaire ne comporte pas les questions appropriées,
- . soit la puissance est insuffisante, aux vues de l'effectif, pour mettre en évidence une telle différence.



---

### **3) Existe-t-il des pathologies associées à une gravité, parmi les victimes de l'étude SVS ?**



---

## Définition du critère de gravité

Première agression à moins de 7 ans ou  
inceste

**et**

agressions multiples



---

## Résultat

Le modèle multivarié a mis en évidence 6 critères indépendamment associés à cette « gravité » [pouvoir explicatif (R<sup>2</sup>) = 17%]

Ce sont :

- Affection ORL
- Affection dermatologique
- Maladie endocrinienne
- Absence de claustrophobie
- Absence de consommation excessive d'alcool
- Antécédent de fausse couche

Ces résultats devront être confirmés par de futures études.



# CONCLUSION

---

- Importance de la triade et de la tétrade de l'inceste
- Importance des pathologies ORL, dermatologiques et endocriniennes comme facteur de gravité, à confirmer par de futures études



---

Merci de votre attention

---